

(19)



Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets



(11)

EP 0 882 697 A1

(12)

DEMANDE DE BREVET EUROPEEN

(43) Date de publication:
09.12.1998 Bulletin 1998/50

(51) Int. Cl.⁶: **C07C 43/188**, C11B 9/00,
C07C 35/23, C07C 69/03

(21) Numéro de dépôt: 98109622.5

(22) Date de dépôt: 27.05.1998

(84) Etats contractants désignés:
AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU
MC NL PT SE
Etats d'extension désignés:
AL LT LV MK RO SI

(30) Priorité: 06.06.1997 CH 1373/97

(71) Demandeur: **FIRMENICH SA**
1211 Genève 8 (CH)


(72) Inventeurs:
• **Schulte-Elte, Karl-Heinrich**
1213 Onex (CH)

• **Pamingle, Hervé**
1290 Versoix (CH)
• **Vial, Christian**
1202 Geneve (CH)

(74) Mandataire:
Salvaterra-Garcia, Maria de Lurdes
Firmenich SA
Département des Brevets
Case Postale 239
1211 Genève 8 (CH)


(54) **Composés parfumants à odeur Boisée, fruitée**

(57) La présente invention a pour objet l'utilisation en parfumerie des composés de formule générale



(I)

ou




(II)

Le nouveau caractère olfactif de ces composés est la combinaison des notes boisées avec des notes fruitées. Une synthèse pour la préparation des composés de formule (II) à partir des composés de formule (I) est décrite.

EP 0 882 697 A1

Description

La présente invention a trait à des ingrédients parfumants nouveaux. Elle concerne plus particulièrement des composés de formule générale




définie plus loin et leur utilisation dans la parfumerie.

Ces composés possèdent de nouvelles propriétés odorantes à savoir des odeurs boisées et, en même temps, fruitées, cette combinaison de caractéristiques olfactives n'étant pas connue parmi les composés de l'art antérieur. La demande concerne également des voies de synthèse et des produits intermédiaires nouveaux servant à préparer ces composés.

Les composés qui sont l'objet de la présente invention possèdent comme caractéristique commune le squelette bicyclique 7,7-diméthyl-10-méthylène-bicyclo [4.3.1]décane qui porte des groupes osmophores comprenant un atome d'oxygène en position exocyclique 3. Le bicycle peut, par ailleurs, comporter d'autres substituants, par exemple des groupes alkyles.

L'utilisation de substances de structure similaire, comprenant le système bicyclique 6,6-diméthyl-9-méthylène-bicyclo[3.3.1]nonane, c'est-à-dire possédant un carbone de moins dans le cycle qui comporte le groupe osmophore, est connue dans la parfumerie depuis longtemps. D'un point de vue olfactif, la substance la plus importante faisant partie de ce groupe connu est le 2-éthoxy-2,6,6-triméthyl-9-méthylène-bicyclo [3.3.1]nonane de formule




dont la synthèse a été exécutée pour la première fois dans les années 50 par Stoll et al. (voir US-A-2,803,662). Depuis, plusieurs synthèses ont été décrites pour ce produit, toutes menant à un mélange d'isomères *exo*- et *endo*-éthoxy, avec la proportion relative entre ces deux isomères variant considérablement selon la synthèse choisie. Un mélange de ces isomères est par ailleurs en vente sous le nom commercial de Physeol (origine : Firmenich SA, Genève, Suisse). Ce composé commercial possède une odeur boisée qui est accompagnée d'une note éther ambrée.

Or, nous avons maintenant découvert que la présence d'un atome de carbone supplémentaire dans le cycle comportant le groupe osmophore résulte en des composés possédant des propriétés olfactives nettement différentes de celles du Physeol et de ses analogues, à savoir des notes boisées et ambrées doublées d'une intense note fruitée, notamment de type rhubarbe ou pamplemousse. En vue de la connaissance des propriétés des composés bicycliques de type 6,6-diméthyl-9-méthylène-bicyclo[3.3.1]nonane cités auparavant, et du Physeol en particulier, ce résultat est donc fortement inattendu et rend les composés (I) et (II) particulièrement utiles en parfumerie, de par la combinaison de caractères olfactifs citée plus haut.

L'objet de la présente invention est donc la mise à la disposition de nouveaux produits parfumants qui présentent l'odeur spécifique mentionnée ci-dessus et les synthèses de ces produits.

En conséquence, la présente demande décrit des composés de formule générale



dans laquelle

15 R^1 et R^2 , qui peuvent être identiques ou différents, représentent un groupe méthyle ou éthyle, de préférence un groupe méthyle,

R^3 représente un atome d'hydrogène ou un groupe alkyle de C_1 à C_4 , linéaire ou ramifié,

20 R^4 représente un atome d'hydrogène, un groupe alkyle de C_1 à C_4 , linéaire ou ramifié ou un groupe acyle de formule $R^5C(O)-$, R^5 étant un atome d'hydrogène ou un groupe alkyle de C_1 à C_4 , linéaire ou ramifié,

et leur utilisation dans la parfumerie.

La caractéristique commune des composés selon la présente invention comportant le système bicyclique 7,7-diméthyl-10-méthylène-bicyclo[4.3.1]décane qui est *oxo*-substitué dans la position 3 est leur caractère olfactif. Leur

25 odeur peut être décrite comme une note boisée qui est doublée d'une intense note fruitée. La qualité et l'intensité de cette note fruitée peut être diverse, mais la note boisée de fond est toujours nettement présente, ce qui rend ces composés particulièrement utiles en parfumerie.

Bien entendu, malgré le fait que les composés selon l'invention possèdent une odeur commune de type boisée-fruitée, il existe bien des différences, parfois très prononcées, entre les divers produits. Ces différences peuvent se

30 révéler non seulement pour des composés de structure chimique différente, mais aussi même entre isomères stéréochimiques d'un composé donné.

Les propriétés odorantes des composés selon la présente invention se trouvent représentées au mieux dans l'acétate de 7,7-diméthyl-10-méthylène-bicyclo[4.3.1]déc-3-yle et le 3-méthoxy-7,7-diméthyl-10-méthylène-bicyclo[4.3.1]décane. Ces deux composés sont donc préférés selon l'invention.

35 L'acétate de 7,7-diméthyl-10-méthylène-bicyclo[4.3.1]déc-3-yle, sous forme d'un mélange d'isomères de configuration *exo* et *endo*, développe lui une note boisée qui est doublée d'une note de type rhubarbe. L'impression globale de l'odeur de ce composé est celle d'une note boisée-racineuse de type Vetyver, le caractère racineux étant accompagné du caractère fruité mentionné. Il s'agit en fait d'un caractère olfactif très prisé en parfumerie fine.

Les deux isomères *exo* et *endo* de ce composé possèdent des odeurs distinctes. En effet, l'isomère *exo* développe

40 une odeur où le caractère boisé, cèdre est plus marqué, alors que l'isomère *endo* possède lui une note de type boisé où les caractères rhubarbe et pamplemousse sont très prononcés.

Le 3-méthoxy-7,7-diméthyl-10-méthylène-bicyclo[4.3.1]décane se présente lui aussi sous deux formes stéréoisomères, à savoir les isomères de configuration *exo* et *endo*, qui présentent des caractéristiques olfactives différentes l'un de l'autre, et encore de celles de leur mélange. L'isomère *endo* développe une odeur de type hespéridépample-

45 mousse, rappelant la nootkatone, qui est très puissante, alors que l'isomère *exo* présente une note boisée typique, chaude, avec un aspect rappelant l'Ambrox® (8,12-époxy-13,14,15,16-tétranorlabdane, marque enregistrée de Firmenich SA, Genève, Suisse) et l'iris. Les mélanges des deux isomères possèdent des odeurs ayant beaucoup de volume et dont les notes pamplemousse et boisée sont très substantives et tenaces. D'une façon générale, les deux isomères, ainsi que leurs mélanges, sont tous des ingrédients parfumants utiles.

50 Les composés répondant aux formules (I) et (II), qu'ils se présentent sous forme de l'un des isomères à l'état pur ou d'un mélange d'isomères, peuvent être utilisés aussi bien en parfumerie fine qu'en parfumerie fonctionnelle. Ils se montrent appropriés pour la préparation de compositions parfumantes diverses, de bases et concentrés parfumants, ainsi que de parfums et eaux de toilette, auxquels ils confèrent des caractères boisés-fruités. Leur utilisation dans le parfumage d'articles divers tels que les savons, gels de douche ou bain, shampooings, crèmes ou lotions après-shampooing, préparations cosmétiques ou désodorisants corporels ou d'air ambiant est aussi avantageuse.


De plus, ils conviennent également au parfumage de détergents ou adoucissants textiles et de produits d'entretien.

Les proportions dans lesquelles les composés selon la présente invention peuvent être utilisés dans les produits divers cités varient dans une gamme de valeurs très étendue. Ces valeurs sont dépendantes de la nature du produit

que l'on veut parfumer et de l'effet olfactif désiré. Ils sont aussi dépendants de la nature des coingrédients dans une composition donnée, lorsque les composés selon l'invention sont utilisés en mélange avec des coingrédients parfumants, des solvants ou des adjuvants usuels dans l'art. Bien entendu, les composés selon l'invention peuvent également être ajoutés aux compositions et articles parfumés soit seuls, soit en solution dans des solvants d'usage courant.


A titre d'exemple on peut citer des concentrations de l'ordre de 1 à 10%, voire même 20% ou plus, en poids des composés selon l'invention, par rapport au poids de composition parfumante dans laquelle ils sont incorporés. Des concentrations bien inférieures à celles-ci peuvent être utilisées lorsque ces composés sont appliqués dans le parfumage des produits divers cités auparavant.

L'invention concerne également un procédé pour la préparation d'un composé de formule



dans laquelle les symboles R¹ à R⁴ sont définis plus haut, caractérisé en ce qu'il comprend les étapes suivantes :

a) la réaction d'un composé de formule



dans laquelle R¹ et R² ont le sens indiqué à la formule (II), avec un agent réducteur, pour obtenir le composé correspondant de formule (II) dans laquelle R³ et R⁴ représentent chacun un atome d'hydrogène ; ou

b) la réaction d'un composé de formule (I) avec un réactif organométallique approprié, pour former le composé de formule (II) correspondant dans lequel R³ représente un groupe alkyle de C₁ à C₄ linéaire ou ramifié et R⁴ représente un atome d'hydrogène ;

c) le cas échéant, l'éthérification du composé (II) obtenu en a) ou en b) pour former l'éther correspondant;

d) le cas échéant, l'estérification du composé (II) obtenu en a) ou en b) pour former l'ester correspondant.

Les produits clés dans ce procédé sont la cétones cycliques (I) à partir desquelles on a accès aux produits recherchés. Ces cétones peuvent être préparées comme indiqué au schéma I. En modifiant chimiquement la fonction cétonique, on peut créer des groupes osmophores de caractères différents, ce qui donne lieu aux variations dans les caractères olfactifs des molécules formées.

On connaît de l'art antérieur un procédé analogue à celui montré au schéma I et servant à préparer la cétone de formule (I) dans laquelle R¹ et R² représentent un groupe méthyle (voir, par exemple, A. Ruveda et al., Tetrahedron 1990 (46), 4149; J.D. White, T.C. Somers et K.M. Yager, Tetrahedron Lett. 1990 (31), 59). Le procédé utilise comme produit de départ la α -dihydroionone, correspondant à la formule (IV) du schéma I suivant, avec R¹ = R² = méthyle. L'odeur de la cétone ainsi obtenue, ou 7,7-diméthyl-10-méthylène-bicyclo[4.3.1]décan-3-one, qui est de type boisé, avec une note rappelant le bornéol, n'a jamais été décrite dans la littérature. Cette cétone s'avère donc aussi utile en tant qu'ingrédient parfumant.




Schéma I

25 Les autres produits de départ de formule (IV) représentés au schéma I peuvent être obtenus commercialement ou facilement préparés à partir de produits commerciaux.

Le schéma II montre les possibilités de transformation des cétones de formule (I).




Schéma II

Il ressort du schéma II que les cétones (I) peuvent être directement réduites dans les alcools (IIa) correspondants à l'aide d'agents réducteurs appropriés. Dans ce contexte, on peut citer par exemple le LiAlH_4 ou le NaBH_4 . Le solvant dans lequel se déroule la réduction est choisi parmi les éthers, par exemple le THF ou l'éther diéthylique ou les alcools, par exemple le méthanol ou l'éthanol. Il est évident que, en sus des agents réducteurs et solvants cités ci-dessus, il y a d'autres réactifs et solvants qui eux aussi donnent des résultats satisfaisant les exigences de la présente invention.

De la même façon, les cétones (I) sont aussi susceptibles de réagir avec un réactif organométallique (étape d) pour fournir, après l'hydrolyse, l'alcool α -substitué (IIb) correspondant. Comme agent métallant approprié, on peut citer les composés Grignard et les composés organolithiens, et d'autres agents métallants qui sont connus de l'homme de métier. La réaction est exécutée dans un solvant inerte qui, le cas échéant, est capable de stabiliser le réactif organométallique. En tant que solvant on peut utiliser un solvant courant dans ce type de réactions.

Les alcools (IIa) et (IIb) sont susceptibles d'être transformés dans les éthers (IIa') et (IIb') à l'aide d'agents d'éthérification, [voir les étapes (b) ou (e)]. Une voie convenable est la synthèse Williamson qui consiste à transformer l'alcool en un alcoolate alcalin et faire réagir celui-ci avec l'halogénure de l'alcane souhaité. Il s'est avéré approprié d'utiliser un hydruure alcalin pour la transformation du groupe alcool en alcoolate, par exemple le KH ou le NaH . Le sel alcalin étant formé, la réaction d'éthérification peut se faire par exemple avec un halogénure d'alkyle. Pour la mise en oeuvre de la réaction, on choisit un solvant inerte dans lequel la réaction procède facilement. A titre d'exemple, on peut citer le THF, ou l'éther diéthylique. Bien entendu, la réaction d'éthérification étant connue en principe, l'homme de métier est capable de trouver d'autres voies d'éthérification ainsi que des solvants qui répondent aux exigences de la présente invention.

Par ailleurs, les alcools (IIa) et (IIb) peuvent être estérifiés, [étape (c) ou (f)] à l'aide de réactifs courants, par exemple un chlorure ou anhydride de l'acide carboxylique respectif. Les solvants pouvant être utilisés dans la réaction susmentionnée sont, à l'instar des réactifs d'estérification, courants pour ce type de réaction.

L'invention sera maintenant décrite plus en détail à l'aide des exemples suivants, dans lesquels les températures sont indiquées en degrés centigrades et les abréviations ont le sens usuel dans l'art.

Exemples

Remarque générale : tous les spectres RMN ont été mesurés dans le CDCl_3 .

Exemple 1

Préparation des alcools de formule (IIb)

Méthode générale :

Dans un ballon tricol muni d'un réfrigérant, d'un thermomètre et d'une ampoule d'introduction, on place, sous atmosphère de N_2 , 2,4 g (0,1 mole) de magnésium en copeaux. On ajoute 30 ml d'éther anhydre, 1 cristal d'iode et on amorce la réaction à l'aide de quelques gouttes d'halogénure. Ensuite, on introduit goutte à goutte une solution de 0,12 mole de l'halogénure d'alkyle approprié dans 50 ml d'éther anhydre, tout en laissant réagir à reflux. A la disparition du magnésium, on introduit goutte à goutte une solution de 0,078 mole de la cétone de formule (I) appropriée, à savoir la 7,7-diméthyl-10-méthylène-bicyclo[4.3.1]décan-3-one ou l'une de ses homologues, dans 50 ml d'éther anhydre, tout en laissant réagir à reflux. On brasse le mélange réactionnel encore 2 heures à température ambiante, on le verse sur de la glace et on reprend à l'éther. Après lavage du mélange obtenu à la saumure, on sèche sur Na_2SO_4 . Ensuite, on filtre, on rince, et on concentre sous vide. Le mélange est purifié par chromatographie sur SiO_2 en utilisant comme éluant un mélange cyclohexane:éther/8:2. Le produit est obtenu par distillation sur résidus au four à boules à 10 Pa.

a) 3,7,7-triméthyl-10-méthylène-bicyclo[4.3.1]décan-3-exo-ol
halogénure d'alkyle utilisé : iodure de méthyle.

On obtient 11,2 g d'huile incolore avec un rendement de 69% de la théorie, qui est constituée exclusivement de l'isomère *exo*.

Odeur : note boisée-cèdre, avec un caractère de patchouli et légèrement de transpiration.

IR (pur) : 3480, 2940, 1450, 900 cm^{-1}

^1H -RMN (360 MHz) : 0,90(s, 3H) ; 0,94(s, 3H) ; 1,09(m, 1H) ; 1,16(s, 3H) ; 1,38(m, 1H) ; 1,52-1,89(m, 9H) ; 2,07(t, $J=7\text{Hz}$, 1H) ; 2,51(m, 1H) ; 4,76(d, $J=3\text{Hz}$, 1H) ; 4,95(d, $J=3\text{Hz}$, 1H) δ ppm

^{13}C -RMN (90 MHz) : 25,6(q) ; 28,12(q) ; 28,19(q) ; 29,4(t) ; 30,1(t) ; 32,9(q) ; 34,9(s) ; 38,2(d) ; 40,2(t) ; 43(t) ; 53,2(d) ; 73,5(s) ; 111,5(t) ; 154,9(s) δ ppm

SM m/z 208 (M^+ , 4) ; 190(12) ; 175(30) ; 161(19) ; 147(30) ; 134(57) ; 119(77) ; 105(97) ; 93(97) ; 79(91) ; 69(55) ; 55(50) ; 41(100).

b) 3-éthyl-7,7-diméthyl-10-méthylène-bicyclo[4.3.1]-3-décan-ol
halogénure d'alkyle utilisé : bromure d'éthyle.

On obtient 12,8 g d'huile incolore constitué de 2 isomères *endo/exo* (1/9) avec un rendement de 74% de la théorie.

Odeur : note boisée-cèdre, avec un caractère ambré, note de transpiration plus prononcée que dans l'exemple précédent.

IR (pur) : 3450, 2950, 1660, 1450, 900 cm^{-1}

^1H -RMN (360 MHz) : 0,86-0,93(m, 9H) ; 1,08(m, 1H) ; 1,41(m, 3H) ; 1,47-1,79(m, 8H) ; 1,87(m, 1H) ; 2,05(m, 1H) ; 2,7(m, 1H) ; 4,74(d, $J=3\text{Hz}$) ; 4,95(d, $J=3\text{Hz}$) δ ppm

SM m/z 222 (M^+ , 3) ; 204(13) ; 193(32) ; 175(45) ; 148(48) ; 133(48) ; 123(98) ; 107(100) ; 93(90) ; 85(28) ; 79(90) ; 69(45) ; 57(93) ; 41(72).

Exemple 2Préparation des éthers de formule (IIa')5 *Méthode générale :*

Dans un ballon tricol muni d'un réfrigérant, d'un thermomètre et d'une ampoule d'introduction, on place, sous atmosphère de N₂, 12 ml (0,06 mole) d'une suspension de KH dans l'huile (20%, FLUKA), et on rince trois fois avec du pentane anhydre afin d'éliminer le plus possible d'huile. Ensuite, on introduit goutte à goutte une solution de 0,049 mole d'alcool de formule (IIb) approprié, à savoir le 7,7-diméthyl-10-méthylène-bicyclo[4.3.1]décan-3-ol ou l'un de ses analogues dans 48 ml de THF anhydre, on brasse le mélange réactionnel pendant 2 h, et on introduit ensuite goutte à goutte 0,81 mole de l'halogénure d'alkyle choisi. Après, on brasse encore 3 h à température ambiante. Le mélange réactionnel est versé sur de la glace, puis repris à l'éther et lavé à la saumure jusqu'à neutralité. Après avoir séché sur Na₂SO₄, on filtre et concentre sous vide.

15

a) 3-méthoxy-7,7-diméthyl-10-méthylène-bicyclo[4.3.1]décane
halogénure d'alkyle utilisé : iodure de méthyle

Mélange composé de 2 isomères (29/71).

20 Ether méthylique *endo* (Pic 1 ; 29% dans le mélange).

Ether méthylique *exo* (Pic 2 ; 71% dans le mélange).

Après distillation sur une colonne Vigreux, on obtient 9,05 g d'une huile incolore.

Rendement = 88% de la théorie.

25 IR (pur) : 3080, 2920, 2800, 1640, 1450, 1100, 880 cm⁻¹

¹H-RMN (360 MHz) : 0,85(s, 3H, *exo*) ; 0,87(s, 3H, *endo*) ; 0,91(s, 3H, *exo*) ; 0,92(s, 3H, *endo*) ; 1,05(m, 1H) ; 1,35-2,04(m, 10H) ; 2,09(dd, J=3, 10Hz, 1H) ; 2,53(m, 1H, *endo*) ; 2,61(m, 1H, *exo*) ; 3,27(s, 3H, *endo*) ; 3,31(s, 3H, *exo*) ; 4,6(d, J=3Hz, 1H, *endo*) ; 4,61(d, J=3Hz, *exo*) ; 4,71(d, J=3Hz, *endo*) ; 4,83(d, J=3Hz, *exo*) δ ppm

30 ¹³C-RMN (90 MHz) : 24,2(t) ; 26(t) ; 27,3(q) ; 28,2(q) ; 28,3(t) ; 31(t) ; 31,2(t) ; 34,3(t) ; 34,5(s) ; 37,3(d) ; 41,2(t) ; 51,5(d) ; 52,6(d) ; 55,9(q) ; 78,4(d) ; 82,3(d) ; 110,5(t) ; 112(t) ; 151,4(s) ; 153(s) δ ppm

Les isomères *endo* et *exo* ont été préparés à l'état pur à partir de l'isomère *endo* et *exo* de l'acétate de 7,7-diméthyl-10-méthylène-bicyclo[4.3.1]dec-3-yl (voir exemple 3) par saponification suivie d'une éthérification.

35 Les données analytiques étaient les suivantes :

Ether méthylique *endo* :

IR (pure) : 3080, 2920, 2800, 1640, 1450, 1100, 880 cm⁻¹

40 ¹H-RMN (360 MHz) : 0,87(s, 3H) ; 0,92(s, 3H) ; 1,0-2,03(m, 12H) ; 2,53(m, 1H) ; 3,27(s, 3H) ; 4,6(d, J=3Hz, 1H) ; 4,71(d, J=3Hz, 1H,) δ ppm

¹³C-RMN (90 MHz) : 25,9(t) ; 28,1(t) ; 29,1(q) ; 30,2(q) ; 34,2(t) ; 34,3(t) ; 34,5(s) ; 37,3(d) ; 41,2(t) ; 52,6(d) ; 55,9(q) ; 77,4(d) ; 110,5(t) ; 153,2(s) δ ppm

SM m/z 208 (M⁺, 0) ; 19(5) ; 176(7) ; 165(3) ; 161(17) ; 147(8) ; 137(26) ; 121(69) ; 111(63) ; 107(44) ; 91(47) ; 85(100) ; 79(63) ; 67(21) ; 41(38).

45

Ether méthylique *exo* :

IR (pure) : 3080, 2920, 2800, 1640, 1450, 1100, 880 cm⁻¹

50 ¹H-RMN (360 MHz) : 0,85(s, 3H) ; 0,91(s, 3H) ; 1,06(m, 1H) ; 1,36-1,92(m, 9H) ; 2,09(dd, J=3, 10Hz, 1H) ; 2,61(m, 1H) ; 3,31(s, 3H) ; 4,61(d, J=3Hz, 1H) ; 4,83(d, J=3Hz, 1H,) δ ppm

¹³C-RMN (90 MHz) : 24,2(t) ; 27,2(q) ; 27,9(q) ; 28,3(t) ; 31,0(t) ; 31,3(t) ; 31,2(s) ; 36,7(d) ; 41,2(t) ; 51,5(d) ; 55,9(q) ; 82,3(d) ; 111,9(t) ; 151,3(s) δ ppm

SM m/z 208 (M⁺, 5) ; 193(1) ; 176(15) ; 161(39) ; 152(20) ; 147(13) ; 137(24) ; 133(41) ; 120(100) ; 107(79) ; 91(72) ; 85(34) ; 79(100) ; 71(33) ; 67(24) ; 55(27) ; 41(51).

55

Odeur : décrite dans l'introduction.

b) 3-éthoxy-7,7-diméthyl-10-méthylène-bicyclo[4.3.1]décane

Les éthers éthyliques ont été préparés selon le procédé décrit ci-dessus en utilisant du bromure d'éthyle comme halogénure. Après distillation au four à boules à 150° et 10 Pa, on a obtenu 0,95 g d'une huile incolore.

5 Rendement = 89% de la théorie.

Mélange composé de 2 isomères (71/29).

Ether éthylique *endo* (Pic 1 ; 29% dans le mélange).

Ether éthylique *exo* (Pic 2 ; 71% dans le mélange).

10 Odeur : intense, boisée-cèdre avec une note de cacahuètes grillées, avec une note de fond rappelant la rhubarbe et le pamplemousse.

IR (pur) : 3080, 2940, 2800, 1640, 1460, 1100, 890 cm⁻¹

15 ¹H-RMN (360 MHz) : 0,84(s, 3H, *exo*) ; 0,86(s, 3H, *endo*) ; 0,89(s, 3H, *exo*) ; 0,91(s, 3H, *endo*) ; 1,05(large s, 1H) ; 1,15(t, J=7Hz, 3H, *exo*) ; 1,17(t, J=7Hz, 3H, *endo*) ; 1,31-2,01(m, 10H) ; 2,1(large s, 1H) ; 2,6(m, 1H, *exo*) ; 2,68(m, 1H, *endo*) ; 3,30-3,50(m, 2H) ; 4,59(d, J=3Hz, 1H, *endo*) ; 4,62(d, J=3Hz, 1H, *exo*) ; 4,82(d, J=3Hz, 1H, *exo*) ; 4,89(d, J=3Hz, 1H, *endo*) δ ppm

¹³C-RMN (90 MHz) : 15,8(q) ; 24,5(t) ; 26,1(t, *endo*) ; 27,2(q) ; 28,1(t) ; 28,5(q) ; 31(t) ; 34,2(s) ; 35,1(t) ; 36,7(d) ; 37,4(d, *endo*) ; 42,4(t) ; 51,4(d) ; 52,6(d, *endo*) ; 63,3(t) ; 63,5(t, *endo*) ; 80,7(d) ; 110,4(t, *endo*) ; 111,9(t) ; 151,4(s) ; 153(s, *endo*) δ ppm

20 SM m/z 222 (M⁺, 1) ; 207(1) ; 176(9) ; 161(30) ; 147(11) ; 133(36) ; 120(44) ; 107(69) ; 99(26) ; 91(73) ; 85(39) ; 79(100) ; 67(28) ; 55(38) ; 41(47).

Exemple 3

25 Préparation des esters de formule (IIa'')

Acétate de 7,7-diméthyl-10-méthylène-bicyclo[4.3.1]déc-3-yle

30 Dans un ballon tricol muni d'un réfrigérant, on a placé, sous atmosphère de N₂, 0,9 g (4,6 mmoles) de 7,7-diméthyl-10-méthylène-bicyclo[4.3.1]décan-3-ol, 8 ml d'anhydride acétique et 1 goutte d'acide phosphorique. On a laissé brasser pendant la nuit à température ambiante. Ensuite, on a ajouté 50 ml d'H₂O et brassé encore une nuit à température ambiante. Le mélange obtenu a été repris à l'éther, lavé à la saumure jusqu'à neutralité et séché sur Na₂SO₄. Après filtration et concentration sous vide on a distillé au four à boules à 150°C (10 Pa).

35 On a obtenu 1,09 g d'une huile incolore, avec un rendement de 99% de la théorie. Le mélange obtenu était composé de 2 isomères (71/29) qui ont été séparés par chromatographie en phase gazeuse sur une colonne de type Carbowax[®] de 5 mètres. Odeur: décrite dans l'introduction.

Acétate *exo* (Pic 1 ; 71% dans le mélange).

40 IR (pur) : 3060, 2950, 1750, 1640, 1460, 1370, 1250, 1040, 900 cm⁻¹

¹H-RMN (360 MHz) : 0,85(s, 3H) ; 0,9(s, 3H) ; 1,08(dd, J=5,14Hz, 1H) ; 1,4(dd, J=4, 14Hz, 1H) ; 1,5-1,9(m, 8H) ; 2,0(s, 3H) ; 2,1(m, 1H) ; 2,62(m, 1H) ; 4,64(d, J=3Hz, 1H) ; 4,84(d, J=3Hz, 1H) ; 4,89(m, 1H) δ ppm

¹³C-RMN (90 MHz) : 21,6(q) ; 23,9(t) ; 27,3(q) ; 28(q) ; 28(t) ; 30,8(t) ; 32(t) ; 34,3(s) ; 36,8(d) ; 40,8(t) ; 51,4(d) ; 75,6(t) ; 112,4(t) ; 151(s) ; 170,5(s) δ ppm

45 SM m/z 236 (M⁺, 0) ; 176(56) ; 161(47) ; 147(13) ; 133(48) ; 120(83) ; 105(93) ; 91(100) ; 79(82) ; 69(41) ; 55(31) ; 43(83).

Acétate *endo* (Pic 2 ; 29% dans le mélange)

50 IR (pur) : 3060, 2950, 1750, 1640, 1460, 1370, 1250, 1040, 900 cm⁻¹

¹H-RMN (360 MHz) : 0,87(s, 3H) ; 0,91(s, 3H) ; 1,08(d, J=14Hz, 1H) ; 1,39(d, J=14Hz, 1H) ; 1,45-2,07(m, 9H) ; 1,99(s, 3H) ; 2,58(m, 1H) ; 4,64(d, J=3Hz, 1H) ; 4,78(d, J=3Hz, 1H) ; 4,86(m, 1H) δ ppm

¹³C-RMN (90 MHz) : 21,6(q) ; 25,7(t) ; 28,3(q) ; 28,3(q) ; 29(t) ; 30(t) ; 31,9(t) ; 34,5(s) ; 34,5(t) ; 36,9(d) ; 52,5(d) ; 72,5(d) ; 111,6(t) ; 151,8(s) ; 170,(s) δ ppm

55 SM m/z 236 (M⁺, 0) ; 194(5) ; 176(20) ; 161(40) ; 147(23) ; 136(48) ; 120(65) ; 107(90) ; 91(89) ; 79(84) ; 69(40) ; 55(36) ; 43(100).

Exemple 4

Composition parfumante

5 On a préparé une composition parfumante de base pour un parfum de type masculin en utilisant les ingrédients suivants :

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

5

10

15

20

25

30

35

Ingrédients	Parties en poids
Acétate de linalyle	350
Ambrinol à 10% * 1)	20
Ambrox ® 2)	30
Essence de citron	600
Coumarine	60
α-Damascone à 10% * 3)	50
Dihydromyrcenol 4)	660
Essence d'estragon	20
Farenal ® à 10% * 5)	35
2-Méthyl-4-(2,2,3-triméthyl-3-cyclopentén-1-yl)-4-pentén-1-ol 6)	5
Galaxolide ® 50 7)	200
Geraniol	40
Essence de géranium de Chine	120
Hédione ® 8)	350
Essence de laurier noble	10
Linalol	150
Lyrat ® 9)	80
1-(2,6,6-triméthyl-1-cyclohexyl)-3-hexanol à 10% * 10)	70
Osyrol ® 11)	130
Tonalide ® 12)	500
Vanilline	20
Total	3500

40

45

50

* dans le dipropylène glycol
1) octahydro-2,5,5-triméthyl-2-naphthalenol ; origine : Firmenich SA, Genève, Suisse
2) 8,12-époxy-13,14,15,16-tétranorlabdane ; origine : Firmenich SA, Genève, Suisse
3) origine : Firmenich SA, Genève, Suisse
4) 2,6-diméthyl-7-octén-2-ol ; origine : International Flavors and Fragrances Inc., USA
5) 2,6,10-triméthyl-9-undécanal ; origine : Haarmann & Reimer GmbH, Allemagne
6) origine : Firmenich SA, Genève, Suisse
7) 1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexaméthyl-cyclopenta[g]-2-benzopyrane ; origine : International Flavors and Fragrances Inc., USA
8) dihydrojasmonate de méthyle ; origine : Firmenich SA, Genève, Suisse
9) 4-(4-hydroxy-4-méthylpentyl)-3-cyclohexène-1-carbaldéhyde et 3-(4-hydroxy-4-méthylpentyl)-3-cyclohexène-1-carbaldéhyde ; origine : International Flavors & Fragrances Inc., USA
10) origine : Firmenich SA, Genève, Suisse
11) 7-méthoxy-3,7-diméthyl-2-octanol ; origine : Bush, Boak Allen Ltd., Grande-Bretagne
12) 7-acétyl-1,1,3,4,4,6-hexaméthyltétraline ; origine : PFW, Naarden, Pays-Bas

55

A cette composition de base hespéridée, boisée, musquée on a ajouté 1700 parties en poids de 3-méthoxy-7,7-diméthyl-10-méthylène-bicyclo[4.3.1]décane. On a ainsi obtenu une composition nouvelle dont la note boisée avait acquis une fraîcheur typique des colognes à caractère hespéridé très appréciée.
Lorsqu'on a ajouté 1700 parties en poids de l'acétate de 7,7-diméthyl-10-méthylène-bicyclo[4.3.1]déc-3-yle, on a obtenu une composition nouvelle qui, en plus de sa note de fond boisée, possédait un joli côté racineux évoquant le vététyver.

Exemple 5

Composition parfumante

5 On a préparé, à partir des ingrédients suivants, une composition parfumante de base pour une eau de toilette masculine.

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

	<u>Ingrédients</u>	<u>Parties en poids</u>
	Acétate de benzyle	60
5	Acétate de linalyle	450
	Acétate de phényléthyle	5
	Alcool cinnamique à 50% *	30
10	Aldéhyde amylcinnamique	100
	Aldéhyde C 10 à 10% *	40
	4-(4-hydroxy-1-phényl)-2-butanone à 1% * ¹⁾	30
15	Essence de bergamote	600
	Essence de carvi	70
	Ambrox [®] à 10% ** ²⁾	30
20	Citral pur	320
	Phénoxyacétate d'allyle ³⁾	50
	Coumarine	65
25	Eugénol	90
	Essence de géranium de Chine	90
	Hédione ^{® 4)}	200
30	Héliopropanal ⁵⁾	40
	Indol à 10% ***	70
	Iralia ^{® 6)}	80
35	Jasmone	5
	Essence de lavande	480
	Linalol	800
40	Essence de mandarine	100
	Mousse de chêne abs. du Maroc	60
	Essence de patchouli	150
45	Essence de petitgrain	40
	Essence de romarin	30
	Undécalactone	5
50	β -Ionone ⁷⁾	<u>10</u>
	Total	4100
55		

* dans le dipropylène glycol

** dans le 2-(2-éthoxyéthoxy)-1-éthanol ; origine : Firmenich SA, Genève, Suisse

*** dans la triéthanolamine

1) origine : Firmenich SA, Genève, Suisse

2) voir exemple 4

3) origine : Firmenich SA, Genève, Suisse

4) voir exemple 4

5) 3-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-méthylpropanal ; origine : Firmenich SA, Genève, Suisse

6) méthylionone ; origine : Firmenich SA, Genève, Suisse

7) origine : Firmenich SA, Genève, Suisse

A cette composition de base, on a ajouté 150 parties en poids de 3-méthoxy-7,7-diméthyl-10-méthylène-bicyclo[4.3.1]décane. On a alors observé un renforcement de la note boisée, et encore de façon plus marquée du caractère hespéridé déjà présent dans la composition de base.

L'addition de 150 parties en poids de l'acétate de 7,7-diméthyl-10-méthylène-bicyclo [4.3.1]déc-3-yle, a pour sa part conféré plus de volume et renforcé la note de fond boisée de la composition de base, tout en lui apportant un effet chypré résultant de l'accord du composé de l'invention avec la mousse de chêne.

Exemple 6

Composition parfumante

On a préparé, à partir des ingrédients suivants, une composition parfumante de base destinée à une eau de toilette masculine de type "Boisé-Fougère".

5

10

15

20

25

30

Ingrédients	Parties en poids
Acétate de linalyle	500
Essence de bergamote	200
Citral pur	20
Essence de citron	60
Citronellol	90
Essence de civette purif. à 50% *	20
Coranol ¹⁾	50
Coumarine	80
2-Méthyl-4-(2,2,3-triméthyl-3-cyclopentén-1-yl)-4-pentén-1-ol ²⁾	30
Essence de géranium de Chine	30
Hédione ^{® 3)}	400
Essence de lavandin	180
Lylal ^{® 4)}	300
Essence de mandarine	60
Mousse de chêne abs. du Maroc à 50% *	40
Essence de patchouli	720
Vanilline	20
Total	<u>2800</u>

* dans le dipropylène glycol
1) 4-cyclohexyl-2-méthyl-2-butanol ; origine : Firmenich SA, Genève, Suisse
2), 3), 4) voir exemple 4

35

A cette composition de base on a ajouté 400 parties en poids de 3-méthoxy-7,7-diméthyl-10-méthylène-bicyclo[4.3.1]décane pour obtenir une composition nouvelle dont la note boisée était devenue plus fraîche et avait acquis encore plus de volume. Lorsqu'on a ajouté à cette composition de base déjà bien boisée 400 parties en poids de l'acétate de 7,7-diméthyl-10-méthylène-bicyclo[4.3.1]déc-3-yle, on lui a conféré une dimension plus racineuse, vétyver.

40

Exemple 7

Composition parfumante

45

On a préparé, à l'aide des ingrédients suivants, une composition parfumante pour une eau de toilette de type "oriental".

50

55

5

10

15

20

25

30

Ingrédients	Parties en poids
Acétate de benzyle	130
Acétate de linalyle	230
Ambrinol à 10% * 1)	30
Astrotone 2)	300
4-(4-hydroxy-1-phényl)-2-butanone à 1% * 3)	20
Ambrox ® à 10% ** 4)	80
γ-Decalactone à 10% 5)	90
2-Méthyl-4-(2,2,3-triméthyl-3-cyclopentén-1-yl)-4-pentén-1-ol 6)	20
Galaxolide ® 50 7)	700
Essence de géranium d'Afrique	30
Hédione ® 7)	930
Linalol	125
Lyal ® 8)	310
δ-Nonalactone 9)	10
Essence de patchouli	20
Vanilline	635
Vertofix Coeur ® 10)	340
Total	4000

35

40

* dans le dipropylène glycol
** dans le 2-(2-éthoxyéthoxy)-1-éthanol ; origine : Firmenich SA, Genève, Suisse
1), 4), 6), 7), 8) voir exemple 4
2) 1,4-dioxa-5,17-cyclohéptadécanedione ; origine : Firmenich SA, Genève, Suisse
3) voir exemple 5
5) origine : Firmenich SA, Genève, Suisse
9) origine : Firmenich SA, Genève, Suisse
10) mélange de 9-acétyl-8-cédrène et sesquiterpène de cèdre ; origine : International Flavors and Fragrances Inc., USA

45


En ajoutant 400 parties en poids de 3-méthoxy-7,7-diméthyl-10-méthylène-bicyclo[4.3.1] décane à cette composition de base, on lui a conféré un caractère hespéridé excellent. L'effet de ce composé de l'invention est très marquant à haute concentration, comme ici. La même quantité d'acétate de 7,7-diméthyl-10-méthylène-bicyclo[4.3.1]déc-3-yle ajoute à la composition de base un effet naturel boisé-classique par son mariage avec le patchouli.

Revendications


50

55

1. Utilisation à titre d'ingrédient parfumant d'un composé de formule




ou



dans laquelle

R^1 et R^2 , qui peuvent être identiques ou différents, représentent un groupe méthyle ou éthyle,
 R^3 représente un atome d'hydrogène ou un groupe alkyle de C_1 à C_4 , linéaire ou ramifié,
 R^4 représente un atome d'hydrogène, un groupe alkyle de C_1 à C_4 , linéaire ou ramifié ou un groupe acyle de
 formule $R^5C(O)-$, R^5 étant un atome d'hydrogène ou un groupe alkyle de C_1 à C_4 , linéaire ou ramifié.

2. Utilisation selon la revendication 1, d'un composé de formule




dans laquelle R^3 et R^4 sont définis comme à la revendication 1.

3. Utilisation selon la revendication 2, du 3-méthoxy-7,7-diméthyl-10-méthylène-bicyclo[4.3.1]décane ou de l'acétate de 7,7-diméthyl-10-méthylène-bicyclo[4.3.1]dèc-3-yle.

4. Utilisation selon la revendication 3, de l'exo-3-méthoxy-7,7-diméthyl-10-méthylène-bicyclo[4.3.1]décane, de l'endo-3-méthoxy-7,7-diméthyl-10-méthylène-bicyclo[4.3.1]décane, de l'acétate de l'exo-7,7-diméthyl-10-méthylène-bicyclo[4.3.1] dec-3-yle ou de l'acétate de l'endo-7,7-diméthyl-10-méthylène-bicyclo[4.3.1]dec-3-yle.

5. Composé de formule




dans laquelle les symboles R^1 à R^4 sont définis comme à la revendication 1.

6. 3-Méthoxy-7,7-diméthyl-10-méthylène-bicyclo[4.3.1]décane ou l'acétate de 7,7-diméthyl-10-méthylène-bicy-


clo[4.3.1]déc-3-yle.

7. Exo-3-méthoxy-7,7-diméthyl-10-méthylène-bicyclo[4.3.1]décane, endo-3-méthoxy-7,7-diméthyl-10-méthylène-bicyclo[4.3.1]décane, l'acétate de l'exo-7,7-diméthyl-10-méthylène-bicyclo[4.3.1] dec-3-yle ou l'acétate de l'endo-7,7-diméthyl-10-méthylène-bicyclo[4.3.1]dec-3-yle.
8. Composition parfumante ou article parfumé contenant à titre d'ingrédient parfumant un composé de formule (I) ou (II) telle que définie à la revendication 1.
9. Composition parfumante ou article parfumé contenant à titre d'ingrédient parfumant le 3-méthoxy-7,7-diméthyl-10-méthylène-bicyclo[4.3.1]décane ou l'acétate de 7,7-diméthyl-10-méthylène-bicyclo[4.3.1]déc-3-yle.
10. Composition parfumante ou article parfumé selon la revendication 9, contenant l'exo- ou l'endo-3-méthoxy-7,7-diméthyl-10-méthylène-bicyclo[4.3.1]décane ou l'acétate de l'exo- ou de l'endo-7,7-diméthyl-10-méthylène-bicyclo[4.3.1]dec-3-yle.
11. Article parfumé selon l'une des revendications 8 à 10, sous forme d'un parfum ou d'une eau de toilette, d'un savon, d'un gel de douche ou bain, d'un shampoing ou autre produit d'hygiène capillaire, d'une préparation cosmétique, d'un désodorisant corporel ou d'air ambiant, d'un détergent ou d'un adoucissant textile, ou d'un produit d'entretien.
12. Procédé pour la préparation d'un composé de formule




dans laquelle les symboles R^1 à R^4 ont le sens indiqué à la revendication 1, le procédé comprenant les étapes suivantes :

a) la réaction d'un composé de formule



- dans laquelle R^1 et R^2 ont le sens indiqué à la formule (II), avec un agent réducteur, pour obtenir le composé correspondant de formule (II) dans laquelle R^3 et R^4 représentent chacun un atome d'hydrogène ; ou
- b) la réaction d'un composé de formule (I) avec un réactif organométallique approprié, pour former le composé de formule (II) correspondant dans lequel R^3 représente un groupe alkyle de C_1 à C_4 linéaire ou ramifié et R^4 représente un atome d'hydrogène ;
- c) le cas échéant, l'éthérification du composé (II) obtenu en a) ou en b) pour former l'éther correspondant;
- d) le cas échéant, l'estérification du composé (II) obtenu en a) ou en b) pour former l'ester correspondant.

13. Utilisation d'un composé de formule



(I)

dans laquelle les symboles R¹ et R² ont le sens indiqué à la revendication 1, en tant que produit de départ pour la préparation des composés selon l'une des revendications 5 à 7.



Office européen
des brevets

RAPPORT DE RECHERCHE EUROPEENNE

Numéro de la demande
EP 98 10 9622

DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS			
Catégorie	Citation du document avec indication, en cas de besoin, des parties pertinentes	Revendication concernée	CLASSEMENT DE LA DEMANDE (Int.Cl.6)
D,A	US 2 803 662 A (M. STOLL) 20 août 1957 * le document en entier *	1-11	C07C43/188 C11B9/00
A	EP 0 330 995 A (GIVAUDAN) 6 septembre 1989 * page 2, ligne 41 - ligne 46; revendications; exemples *	1-11	C07C35/23 C07C69/03
D,A	J. D. WHITE: "Synthesis of dihydropallascensin via manganese(III) mediated cyclization of an olefinic beta-keto ester" TETRAHEDRON LETTERS, vol. 31, no. 1, 1990, pages 59-62, XP002075106 OXFORD GB * page 60 *	5-7	
			DOMAINES TECHNIQUES RECHERCHES (Int.Cl.6)
			C07C C11B
Le présent rapport a été établi pour toutes les revendications			
Lieu de la recherche LA HAYE		Date d'achèvement de la recherche 20 août 1998	Examineur Wright, M
<p>CATEGORIE DES DOCUMENTS CITES</p> <p>X : particulièrement pertinent à lui seul Y : particulièrement pertinent en combinaison avec un autre document de la même catégorie A : arrière-plan technologique O : divulgation non-écrite P : document intercalaire</p> <p>T : théorie ou principe à la base de l'invention E : document de brevet antérieur, mais publié à la date de dépôt ou après cette date D : cité dans la demande L : cité pour d'autres raisons & : membre de la même famille, document correspondant</p>			

EPO FORM 1503 03 82 (P04C02)